

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP - 8 - 4 - 87057815



STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA FORÊT

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Ancienne Conserverie de CASAMOZZA

LUCCIANA - 20290 - BORGO -

☎ 95.36.05.70



EDITION CORSE

Bulletin Technique N° 94

du 5 Mars 1987

- : -Après la taille des **agrumes**, n'oubliez pas le . :
- : traitement d'hiver. :
- : -La floraison débute sur les **abricotiers** : pensez :
- : au traitement contre le monilia :
- : -Vigne et **maïs** = quelques conseils :

dernier bulletin
1986



Si ce n'est déjà fait, pensez à vous réabonner,
c'est le dernier bulletin de l'année 1986.

AGRUMES

**** aleurodes, acariens, cochenilles et pucerons**

Les pullulations de cochenilles, acariens, aleurodes et pucerons sont fréquents pendant la végétation. Une bonne protection commence par un traitement d'hiver.

Il permet un assainissement général du verger dès que la taille est terminée.

Utilisez une bouillie contenant 1,5 litre d'huile blanche d'été plus 50 cc de méthidation (ULTRACIDE) ou 1,5 % d'oleoparathion (N.S.) à raison de 2 000 à 2 500 litres de bouillie à l'ha.

Si vous réalisez ce traitement en avril, réduisez à 1 % la quantité d'huile blanche.

P.6.

**** bactériose**

Les attaques de bactériose sont peu fréquentes, mais si certaines plantations sont sensibles, il est recommandé, d'effectuer dès maintenant, un traitement cuprique à 500 g de cuivre métal / hl.

ABRICOTIERS

**** Monilia sur abricotier**

Les arbres atteints se caractérisent par un dessèchement des fleurs, puis des rameaux. On observe également des écoulements de gomme, la formation de chancres à la base des rameaux atteints, et l'apparition de fruits momifiés.

Si vous avez observé des attaques l'an passé, il faut traiter, effectuer au moins deux traitements au stade E et F. Si les attaques ont été très importantes, effectuez un premier traitement dès le stade E.



On voit la corolle

D



On voit les étamines

E



Fleur ouverte

F

benomyl
carbendazyme
triforine
vinchlozoline
thirame
iprodione

BENLATE
N.S.
FUNGINEX SAPROL
RONILAN
N.S.
ROVRAL

VIGNE

--> Dans les régions atteintes par la **flavescence dorée**, brûlez tous les déchets de taille afin d'éliminer une partie des oeufs de cicadelle.

--> Les traitements d'hiver doivent être terminés au moins **deux semaines avant le débourrement**. Un traitement contre l'excoriose est possible au printemps avec d'autres produits.

MAIS

Nos observations sur les résidus de culture de maïs dans la région d'ALERIA, ont montré que 60 % des cannes abritaient soit une sésamie, soit une pyrale. Les dégâts de ces deux parasites s'intensifient d'année en année en CORSE.

Il est donc indispensable, de broyer finement les résidus de récolte. Aussitôt après le broyage, effectuer un travail superficiel du sol afin d'atteindre les chenilles réfugiées dans les collets.

=====